



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Krompir
/ 54. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU

54. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU - 04.06.2020 14:45 - Zaključeno



V posevkih krompirja, ki je po večini v fazi cvetenja (BBCH 65) opazamo povečan pojav ličink **koloradskega hrošča**. Ukrepati začnemo, ko imamo na več rastlino prisotnih 15 do 20 ličink / grm. Insekticide uporabimo zgodaj, ko je večina ličink še majhnih, zgodnje zatiranje je še posebej pomembno pri rabi bioloških pripravkov, s katerim škropimo takoj, ko opazimo izležene ličinke.

Za zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **ALVERDE** (0,25 l/ha), **BISCAYA** (0,3 l/ha), **BULLDOCK EC 25** (0,5 l/ha), **CALYPSO SC 480** (0,1 l/ha), ****CORAGEN** (0,06 l/ha), **EVURE** (0,2 l/ha), **LASER 240 SC** (0,2 l/ha), **LASER PLUS** (0,04 l/ha), **MAVRIK 240** (0,2 l/ha) ali **MOSPILAN 20 SG** (100 g/ha).

V ekološki pridelavi krompirja lahko uporabite pripravek **NEEMAZAL T/S** ali pripravek na osnovi piretrina: **RAPTOL KONCENTRAT**.

Letno skušamo insekticide uporabiti le dvakrat. Vsakič uporabite insekticid iz druge kemične skupine. Če uporabite dotikalne insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. V primeru uporabe sistemskih sredstev krompir zaščitimo za 3 – 5 tednov.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmaceutskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Datum objave obvestila: 04.06.2020 14:45

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)