

61. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 05.06.2020 13:38 - Zaključeno



V nasadih marelic je priporočljivo obnoviti škropljenje proti **marelični pepelovki**. Bolezen lahko zatirate s pripravki na osnovi **žvepla**, oz. z drugimi registriranimi sredstvi.

Pripravki registrirani za zatiranje marelične pepelovke:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Biotip Sulfo 800 SC	6 l/ha
Cosan	5-7,5 kg/ha
Kumulus DF	5-7,5 kg/ha
Microthiol Special	5-7,5 kg/ha
Pepelin	5-7,5 kg/ha
Pol-Sulphur 800 SC	6 l/ha
Score 250 EC	0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha
Sercadis	0,15 l/ha
Thiovit Jet	5-7,5 kg/ha
Vindex 80 WG	5-7,5 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Navadna sadna gniloba

Zgodnje sorte marelic so v fenofazi BBCH 81-85. V omenjenih nasadih je priporočljivo opraviti preventivno škropljenje proti **navadni sadni gnilobi**.

Registrirana sredstva so navedena v spodnji tabeli.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
AMYLO-X	1,5 do 2,5 kg/ha	Karenca ni potrebna
CHORUS 50 WG	0,6 kg/ha	7
PROLECTUS	330 g na 1m višine krošnje; najvišji odmerek 1 kg/ha	1
SCORE 250 EC	0,03 %; najvišji odmerek 0,45 l/ha	7
SERENADE ASO	8 L/ha	Karenca ni potrebna
SIGNUM	0,25 kg/ha na 1m višine krošnje; najvišji odmerek 0,75 kg/ha	7
SWITCH 62,5 WG	0,08%; najvišji odmerek 1 kg/ha	14

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UHVVR | FITO-INFO | NEOKS s.p. © 2014/20