

### 93. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 04.11.2020 14:31 - Zaključeno



V nasadih breskev in nektarin priporočamo jesensko varstvo pred **breskovo kodravostjo**. Primeren termin za nanos pripravkov na osnovi bakra je v času odpadanja listja. S tem tretiranjem boste hkrati poskrbeli še za zaščito lesa pred **drugimi glivičnimi** in **bakterijskim obolenji**. Izbirate lahko med: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha) ali **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha).

Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičarjev (breskev, marelica, češnja, sliva), kot so **listne luknjičavosti**, **monilinijska obolenja**, **listne pegavosti** in **ožigi**, lahko opravite tudi s **CUPRABLAU Z 35 WG** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2-3 kg/ha; le za marelico, češnjo, višnjo in slivo) ali **BADGE WG** (3,5 kg/ha).

Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Za nanos je priporočljivo uporabiti večjo količino vode.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri nizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.**

Datum objave obvestila: 04.11.2020 14:31

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)