

Zahodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica / Koščičarji
/ 120. ŠKROPLJENJE BRESKEV, NEKTARIN, SLIV, MARELIC in ČE

120. ŠKROPLJENJE BRESKEV, NEKTARIN, SLIV, MARELIC in ČE - 28.10.2004 16:00 - Poslano



Prek ranic, ki nastanejo ob odpadanju listja, pogosto vdrejo glivice in bakterije, ki povzročajo odmiranje vej, pri hudih okužbah pa tudi celih dreves. Če ste že med letom opazili smoljenje in sušenje vej in vejic zaradi **breskovega raka**, **ožiga breskove skorje** ali **bakterijskih obolenj**, je nasade omenjenih sadnih vrst med odpadanjem listja priporočljivo škropiti.

Prvič škropimo, ko začne listje odpadati. Ko odpade večina listja, poškopimo še drugič.

Škropljenje je še posebej potrebno, če je vreme deževno in je smiselno tudi v nasadih, kjer okužb še ni.

Kdor nasadov še ni poškopil, lahko v tem času uporabi sredstva na osnovi **bakra** v zmanjšani koncentraciji. V tem času je najprimernejša **1/2 (polovična) koncentracija škropilne brozge**. Priporočamo vam, da navedene koncentracije ne prekoračite, ker baker sicer lahko ožge slabo olesenele dele enoletnih vejic.

Datum objave obvestila: 28.10.2004 16:00

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan

Pripravil: **Ivan Žežlina**

[Seznam registriranih FFS](#)