

Zahodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica / Pečkarji

/ 123. ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK ZOPER HRUŠEV OŽIG IN J

**123. ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK ZOPER HRUŠEV OŽIG IN J - 03.12.2004 13:00 -**  
**Poslano**



Kljub temu, da se v letošnjem letu hrušev ožig ni širil, priporočamo preventivno škropljenje sadovnjakov zoper omenjeno bakteriozo. V času odpadanja listja nastajajo na poganjkih številne odprte rane, na katerih se v ugodnih vremenskih razmerah lahko naselijo bakterije in povzročijo začetno okužbo v obliki vidnih ali prikritih rakastih ran. Število škropljenj je odvisno od vremenskih razmer med odpadanjem listja in takoj po njem. Ker je vreme v tem času deževno je sedaj smiselno opraviti še drugo škropljenje. Sredstva in odmerki, ki jih lahko

uporabljamo za ta namen, so naslednja:

Bordojska brozga, Vedrjul v 0,6 oz. 1,0 % koncentraciji

Cupro 190 EC v 0,5 oz. 0,75 % koncentraciji

Ramin 50, Kupropin v 0,4 oz. 0,5 % koncentraciji

Kocide DF v 0,15 oz. 0,20 % koncentraciji

Champ Formula 2 FLO v 0,15 oz. 0,325 % koncentraciji

Champion v 0,25 oz. 0,5 % koncentraciji

Cuprablau Z v 0,30 oz. 0,5 % koncentraciji

Cuprablau Z ultra v 0,30 oz. 0,5% koncentraciji.

Nižja koncentracija velja za škropljenje v začetku odpadanja listja, višja pa po odpadanju listja.

Škropljenje z bakrom je še posebej priporočljivo za področje Tolminske in humidnejše predele Primorske, kjer se v nasadih pojavlja jablanov rak.

Za učinkovito preprečevanje bolezni je potrebno poleg škropljenja z bakrom opraviti tudi izrezovanje rakastih ran in okuženih vej ter odstranjevanje le teh iz nasada. Rane, ki nastanejo pri izrezovanju, pa je potrebno premazati s fungicidno pasto.

Datum objave obvestila: 03.12.2004 13:00

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan

Pripravil: **Ivan Žežlina**

[Seznam registriranih FFS](#)

