



51. Varstvo hmelja - 06.09.2004 10:58 - Poslano



Vreme je zelo ugodno za razvoj **hmeljeve peronospore** ! Število spor je na večini opazovalnih mest nad kritičnim številom za tolerantne pa tudi za občutljive kultivarje. V vse več primerih opazamo tudi prve okužbe cvetja in storžkov. **Zaradi teh okoliščin je nevarnost nadaljnega razvoja hmeljeve peronospore velika!** Svetujemo vam, da škropljenja ponavljate na vsakih 10 do 12 dni. Uporabite enega od bakrovih pripravkov v predpisanem odmerku.

V kolikor se je hmeljeva peronospora že pojavila na storžkih uporabite **Curzate R** ali **Aliette flash** v predpisanih odmerkih. Pri občutljivih sortah na pepelovko priporočamo preventivno škropljenje s pripravki na podlagi močljivega žvepla, ob pojavu prvih bolezenskih znamenj pa **Sythane 12 E** .

Let metuljev prosene vešče je zaenkrat slab, pa tudi poškodb, ki jih povzročajo gosenice tega škodljivca doslej nismo opazili. Menim o, da proti proseni vešči zaenkrat ni potrebno ukrepati! Glede hmeljeve pršice vam sporočamo, da je v hmeljiščih, ki jih boste obirali koncem prve dekade septembra sedaj zadnji čas za uporabo akaricida. V poštev pride predvsem pripravek Vertimec 1,8 % EC.

Pripravili: Mag. M. Rak – Cizej, dr. S. Radišek, G. Leskošek, M. Zmrzlak in mag. M. Žolnir

Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:58

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)