

45. Varstvo nasadov krompirja - 05.06.2004 11:30 - Poslano



V mnogih nasadih krompirja so vrste sedaj že strnjene, v tistih nasadih, kjer je prvi vzrok krompirja nastopil v začetku maja, pa je bila 5. junija na lokaciji v Latkovi presežena tudi fitoftorna vrednost (150), katera določa v odvisnosti od fenološkega razvoja krompirja uporabo fungicidov s kontaktnim delovanjem. Zaradi ugodnih vremenskih razmer zato priporočamo, da v bujnih nasadih opravite preventivno škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov: kot so: **Antracol WG 70**, **Bakreni antracol**, **Bakreni dithane**, **Dithane DG Neotec**,

Dithane M 45, **Dithane M 45 FLO**, **Dithane EM 70**, **Kor DG**, **Mazeb DF**, **Pinozeb**, **Penncozeb 75 DG**, **Penncozeb 80 WP**, **Pinozeb M 45**, **Polyram** ali **Shirlan 500 SC**.

Pripravili: A. Ferlež, mag. M. Rak-Cizej, M. Zmrzlak

Datum objave obvestila: 05.06.2004 11:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)

