

46. Varstvo jablan - 18.06.2004 02:30 - Poslano

**Jablanov škrlup in pepelasta plesen**

Po dežju 12. in 13. junija na lovilcu spor in objektnih stekelcih še vedno beležimo prisotnost askospor. Torej še vedno obstaja nevarnost primarnih okužb z jablanovim škrlupom. Zato še n aprej priporočamo izmenično uporabo sistemskih in strobilurinskih pripravkov kot so: **Score 250 EC** , **Indar 5 EC** , **Stroby WG** , **Zato 50 WG** , **Clarinet** , **Baycor WP 25** , **Rubigan 12 E** , **Sythane 6 FLO** , **Sythane 12 – E** ali **Topas 100 EC**.

Omenjenim pripravkom je potrebno dodati enega od kontaktnih fungicidov, saj ti dobro ščitijo plodove pred sekundarnimi okužbami škrlupa. Od kontaktnih fungicidov lahko uporabite naslednje: **Delan SC 750**, **Merpan 50 WP** , **Merpan 80 WDG**, **Captane 45 WP** , **Dithan DG** , **Dithan M – 45** , **Mazeb** , **Polyram DF** ali **Sylit** .

Proti pepelasti plesni priporočamo dodajanje pripravkov na osnovi žvepla kot so: Cosan, Kumulus, Microthiol, Močljivo žveplo, Pepelin ali Sumpor SC – 80 vse v 0,2 % koncentraciji.

Jabolčni zavijač

Do 20. junija je čas, da opravite škropljenje proti prvemu rodu jabolčnega zavijača z enim od kontaktnih insekticidov kot so: **Basudin 600 EW** , **Diazol 50 EW** , **Diazinon 20** , **Reldan 40 EC** ali **Zolone liquide** . Za uspešnejše zatiranje jabolčnega zavijača lahko omenjenim insekticidom dodate še bioinsekticid Madex v 1/3 odmerku . Pripravki na osnovi diazinona (Basudin 600 EW, Diazol 50 EW, Diazinon 20) hkrati zatirajo tudi ameriškega in vejičastega kaparja ter zeleno, mokasto in krvavo uš, ki so v tem času lahko prisotni v nasadih. Redno spremljajte tudi populacijo rdeče sadne pršice.

Pripravi: A. Ferlež - Rus

Datum objave obvestila: 18.06.2004 02:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)