

266. VARSTVO VINSKE TRTE - 20.08.2008 16:05 - Poslano



**PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE**

V vinogradih zaključujemo s škropljenji proti **peronospori vinske trte**. Škropljenje priporočamo le še pri poznih sortah, npr. pri Rebuli, Refošku, Cabernet sauvignonu ipd.

Priporočamo predvsem uporabo kontaktnih organskih fungicidov in fungicidov na osnovi bakra.

**Pazite na karencu uporabljenih pripravkov! Glede na sorte grozdja, ki jih imate v vinogradu izbirajte pripravke z ustrezno karencu.**

Vinogradniki, ki so vključeni v integrirano pridelavo grozdja, morajo upoštevati maksimalno število dovoljenih škropljenj letno za posamezni pripravek

Za preprečevanje okužb z **oidijem** v tem času uporabljamo predvsem pripravke na osnovi močljivega žvepla.

**SIVA GROZDNA PLESEN**

V tistih vinogradih, kjer grozdje pogosto gnije je čas za uporabo sredstev proti sivi grozdni plesni (botriticidov).

Kdor je vključen v Integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi: **Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha)**, **Teldor SC 500 (1,0-1,5 l/ha)**, ki imata dovoljenje za dvakratno rabo letno ali **Kidan (3 l/ha)**, **Cantus WG (1,0-1,2 kg/ha)** ali **Mythos (2,5 l/ha)** ali **Pyrus 400 SC (2,0 l/ha)**, ki imajo dovoljenje za enkratno rabo letno.

V letošnjem letu ima dovoljenje za te namene tudi biološki pripravek **Serenade WP (2,5-4,0 kg/ha)**, ki se ga lahko uporablja od konca cvetenja do začetka mehčanja jagod, vendar ne več kot petkrat v eni rastni sezoni.

Škropimo le tisti predel vinske trte, kjer se nahajajo grozdi.

**Pazite na karencu uporabljenih sredstev.**

Člani Integrirane Pridelave grozdja poleg splošnih načel dobre prakse varstva rastlin dosledno upoštevajte pravilnik in navodila za integrirano pridelavo grozdja.

**GROZDNA SUKAČA**

V ravninskem predelu v okolici Vipolž v Goriških Brdih se je v zadnjem tednu zelo povečal ulov metuljčkov **križastega grozdnega sukača**. V ostalih predelih je ulov metuljčkov zelo majhen oz. ga ni. Priporočamo, da v ravninskem predelu **Vipolž** glede na sorte in stopnjo zrelosti grozdja vinograde ustrezno zaščitite.

Možnosti sta dve:

Prva možnost : Uporaba pripravkov: MATCH 050 EC v 0,1% konc. ali NOMOLT v 0,075% konc., ki imajo karencu 28 dni, **ali** RELDAN v 0,1% konc., PYRINEX 25 CS v 0,1% konc., in MIMIC v 0,06% konc. ki imajo karencu 21 dni **ter** LASER v 0,02% konc. ali RUNNER 240 SC v 0,03% konc., ki imajo karencu 14 dni.

Uporabite lahko tudi pripravek STEWARD v 0,015% konc. s 10 dnevno karenčno dobo.

Druga možnost: Uporaba pripravka DELFIN WG pri zgodnejših sortah. Omenjen pripravek nima karence, najbolje pa je, če ga uporabite dvakrat v razmiku 10 dni.

Datum objave obvestila: 20.08.2008 16:05

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan

Pripravil: Ivan Žežlina

[Seznam registriranih FFS](#)

