

266. JABLANE IN HRUŠKE - 20.08.2008 16:05 - Poslano



Nasade jablan in hrušk še naprej škropimo proti **škr lupu** s **kontaktnimi fungicidi kot so** : Delan 700 WG v 0,075% konc., Dithane M-45 v 0,25% konc. , Dithane DG NEOTEC v 0,20- 0,25% konc. , Kor DG v 0,2-0,25% konc. , Captane 45 WP v 0,25 % konc., Merpan 50 WP v 0,25-0,3 % konc. , Merpan 80 WDG v 0,15 % konc., Kor DG v 0,25% konc. Polyram DF v 0,2% konc., Thiram 80 WG v 0,2-0,25% konc., Bellis v 0,08% konc ali Syllit v 0,1-0,16 % konc .

Za preprečevanje okužb z **jablanovo pepelovko** priporočamo uporabo sredstev na osnovi močljivega žvepla (**Cosan, Kumulus, Kalinosul, Microthiol, Močljivo žveplo, Pepelin, Thiovit jet**) v odmerku **2 kg/ha** .

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, moramo pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast in o ukrepu obvestiti bližnje čebelarje. Škropimo proti večeru, ko se čebele umaknejo v panje.

Pazite na karence!

HRUŠEV OŽIG

Vsem imetnikom pečatega sadja priporočamo, da redno in temeljito pregledujejo stanje dreves in v primeru suma na okužbo z **hruševim ožigom** o tem nemudoma obvestijo **fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200)**.

Več informacij na: http://www.furs.si/svn/zvr/hr_ozig.asp

Pripravila: Mojca Rot

Datum objave obvestila: 20.08.2008 16:05

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan

Pripravil: **Ivan Žežlina**

[Seznam registriranih FFS](#)