



267. VARSTVO VINSKE TRTE - 27.08.2008 14:40 - Poslano



### ŠKROPLJENJE PROTI PERONOSPORI V MLADIH VINOGRADIH

Škropljenje proti peronospori je še vedno potrebno v mladih vinogradih, ki še nimajo pridelka. Priporočamo predvsem uporabo sredstev na osnovi bakra in ostalih kontaktnih fungicidov, ki so registrirani za ta namen.

Glede škropljenj proti peronospori v rodnih vinogradih pa priporočamo, da se pred takimi morebitnimi ukrepi posvetujete z ustreznimi strokovnjaki.

#### SIVA GROZDNA PLESEN

Pri poznih sortah, kjer grozdje pogosto gnije je še čas za uporabo sredstev proti sivi grozdni plesni (botriticidov).

Kdor je vključen v Integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi: **Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha)**, **Teldor SC 500 (1,0-1,5 l/ha)**, ki imata dovoljenje za dvakratno rabo letno ali **Kidan (3 l/ha)**, **Cantus WG (1,0-1,2 kg/ha)** ali **Mythos (2,5 l/ha)** ali **Pyrus 400 SC (2,0 l/ha)**, ki imajo dovoljenje za enkratno rabo letno.

V letošnjem letu ima dovoljenje za te namene tudi biološki pripravek **Serenade WP (2,5-4,0 kg/ha)**, ki se ga lahko uporablja od konca cvetenja do začetka mehčanja jagod, vendar ne več kot petkrat v eni rastni sezoni.

Škropimo le tisti predel vinske trte, kjer se nahajajo grozdi.

#### Pazite na karenco uporabljenih sredstev.

Člani Integrirane Pridelave grozdja poleg splošnih načel dobre prakse varstva rastlin dosledno upoštevajte pravilnik in navodila za integrirano pridelavo grozdja.

Datum objave obvestila: 27.08.2008 14:40

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan

Pripravil: **Ivan Žežlina**

[Seznam registriranih FFS](#)

