



72. VARSTVO VINSKE TRTE - 07.08.2012 14:42 - Zaključeno



Obvestilo dne. 7. 8. 2012

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Peronospora in oidij vinske trte

Trenutno vremenske razmere ne ustvarjajo pogojev za nove okužbe s peronosporo. Razmike med škropljenji zato prilagodite količini padavin, (30 L/m² dežja spere fungicidno oblogo, škropljenje je potrebno ponoviti). Nadaljujte s preventivnim pristopom zaščite vinogradov proti peronospori in oidiju vinske trte. Za zaključna škropljenja proti peronospori svetujemo uporabo enega od bakrovih pripravkov kot so: **Champion 50 WG** (0,2 - 0,25 %), **Champ formula 2 Flo** (0,2%), **Cuprablau Z** (0,3 %), **Cuprablau Z ultra** (0,25 %), **Flowbrix Blau SC** (0,25 %), **Kocide DF** (0,2 %), **Kocide 2000** (0,15 – 0,2 %), **Kupro 190 SC** (0,75 %) ali **Bordojsko brozgo** Caffaro WP (0,6 – 0,8 %).

Pri škropljenju aromatičnih sort (Rumeni muškati, Sauvignon, Traminer) pa dajte prednost kontaktnim fungicidom kot so: **Delan 700 WG** (0,05 % konc.), **Folpan 80 WDG** (0,125-0,15 % konc.), **Antracol** ali **Antracol WG 70** v 0,2 % konc., **Electis 75 WG** (0,18% konc.), **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil 80 WP**, **Pencozeb 75 DG**, **Pinozeb M-45** v 0,2 % konc., **Mildicut** (0,4 % konc.) ali **Polyram DF** (0,24 % konc.), saj lahko (kot navajajo nekateri novejši članki) uporaba bakrovih pripravkov pri zadnjih škropljenjih vpliva na razvoj arome.

Proti oidiju dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla v odmerku 3 kg/ha kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Močljivo žveplo**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG**.

Siva grozdna plesen (*Botrytis cinerea*)

Jagode ranih sort in srednje poznih sort se že mehčajo. Trenutno ni pogojev za razvoj sive grozdne plesni. Zato priporočamo, da opravite drugo škropljenje proti sivi grozdni plesni v coni grozdja in pred naslednjim napovedanim obdobjem deževnega vremena z botriticidi kot so: **Teldor SC 500** (0,1 – 0,15 %), **Switch 62,5 WG** (0,08 %), **Rovral Aquaflo** (0,15 %), **Cantus WG** (0,1 – 0,12 %), **Mythos** (0,25 %) ali **Pyrus 400 SC** (0,2 %). Slednje tri pripravke lahko uporabite le enkrat letno. Prav tako lahko uporabite pripravek **Botector** (400g/ha), ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi.

Pri poznih sortah (Laški rizling, Šipon) opravite drugo škropljenje proti sivi grozdni plesni, ko se bodo začele jagode v grozdih mehčati.

Pri izbiri pripravkov pazite na dosledno upoštevanje karenčne dobe!

Preglednica: Karenčna doba

Pripravek	Karenca (dni)
Polyram DF za pridelavo vinskega grozdja	56
Antracol WG, Antracol WG 70, Delan 700 WG	42
Folpan 80 WDG, Kocide DF, Kocide 2000, <i>Pyrus 400 SC</i>	35
Dithan DG, Dithan – M 45, Manfil 80 WP, Manfil 75 WG, Pencozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Cuprablau-Z, Cuprablau-Z ultra, Flowbrix Blau SC, Kupro 190 SC	28
Polyram DF (namizno), Electis 75 WG, Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Močljivo ž., Thiovit jet, Bordojska brozga (vinsko), <i>Cantus WG</i>	28
Mildicut, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Bordojska brozga (namizno), <i>Switch 62,5 WG</i> , <i>Teldor SC 500</i> , <i>Mythos</i> , <i>Rovral Aquaflo</i> ,	21
<i>Botector</i> - karenca zagotovljena s časom uporabe	

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Priprava: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UHVVR | FITO-INFO | NEOKS s.p. © 2014/21