



Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Ostalo / 2. Zatiranje murvovega in ameriškega kaparja

## 2. Zatiranje murvovega in ameriškega kaparja - 10.04.2013 15:33 - Zaključeno



Sadjarje, ki imajo v nasadih težave zaradi prerasnmnožitve kaparjev obveščamo, da je bilo tudi letos izdano **izjemno dovoljenje** za fitofarmaceutsko sredstvo **Admiral 10 EC** za omejevanje populacije murvovega kaparja na koščičarjih in ameriškega kaparja na pečkarjih.

Sredstvo se lahko uporabi samo **enkrat v rastni dobi**, v času **pred cvetenjem**.

Pri breskvah, marelicah in nektarinah se uporablja v fazi BBCH 55-57, oz. ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami, to je v razvojnem stadiju oplojenih samic murvovega kaparja. Odmerek je 35 do 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, **največji dovoljeni odmerek pa je 0,32 l/ha**. Pri jablanah in hruškah se prav tako uporablja v razvojni fazi BBCH 55-57, deluje na prezimele ličinke prve stopnje.

Sredstvo **ni v prosti prodaji**. Pridelovalci, registrirani pri MKO so ga lahko nabavili neposredno preko podjetja Hmezad Exim d.o.o. Žalec.

Sredstvo je **strupeno za čebele**. **Upoštevajte predpise s področja varstva voda!**

V ekoloških nasadih jablan lahko za zatiranje kaparjev uporabite **žvepleno-apneno brozgo**. Za dobro delovanje sredstva naj bo vsaj tri dni brez padavin. Koncentracijo prilagodite razvojnemu stanju drevja. Upoštevajte sredstvu priložena navodila!

Datum objave obvestila: 10.04.2013 15:33

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko

Pripravila: **Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj**

[Seznam registriranih FFS](#)