

55. Varstvo jablan in hrušk - 06.07.2004 14:31 - Poslano

V večini jablanovih in hruševih nasadov so vidne okužbe s škrlupom. V okuženih nasadih je nevarnost širjenja bolezni velika, zato je potrebno redno škropljenje jablan in hrušk z enim izmed dotikalnih fungicidov, kot so **captan, delan, dithane DG, dithane M – 45, kor DG, mazed, merpan 80 WDG, syllit ali polyram DF** ali podoben. Razmake med škropljenji prilagodite padavinam in prirastu plodičev in poganjkov, vendar naj ne bodo daljši od 10 dni. Za varstvo pred jablanovo plesnijo škropivu obvezno dodajte **karathane** ali **žveplov pripravek**. Pri drevju, ki je okuženo z jablanovo plesnijo priporočamo izrezovanje okuženih poganjkov in škropljenje z enim izmed triazolnih ali strobilurinskih pripravkov. Izrezovanje poganjkov opravite v suhem vremenu.

Potrebno je redno škropljenje nasadov proti jabolčnemu zavijaču, še posebej zato, ker se poleg jabolčnega zavijača v nasadih pojavlja tudi breskov molj, ki povzroča podobne škode na plodovih. Dinamika razvoja škodljivcev je v različnih pridelovalnih območjih in legah različna, kar je potrebno upoštevati pri rokih zatiranja. Spremljajte razvoj škodljivcev v nasadih in upoštevajte navodila regionalnih prognostičnih centrov.

Datum objave obvestila: 06.07.2004 14:31

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko

Pripravila: **Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj**

[Seznam registriranih FFS](#)

