

2. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 21.02.2014 10:17 - Zaključeno



Obvestilo dne. 21. 2. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Glavnina sadnih vrst je v fazi mirovanja. Samo na zelo sončnih legah in peščenih tleh se brsti breskev in nektarin počasi napenjajo ter vstopajo v fenološko fazo začetka brstenja B (po Flecklingerju). Po začetku brstenja in ob izpolnjenih vremenskih pogojih, nastopi obdobje za okužbe z **breskovo kodravostjo**, ki je gospodarsko najpomembnejše boleznì breskev in nektarin. Za okužbo morajo biti izpolnjeni naslednji vremenski pogoji: dovolj padavin in temperature višje od 6 °C. Trenutno je smiselno opraviti škropljenje proti breskovi kodravosti z bakrovimi pripravki kot so: **Champion 50 WG** (0,5% konc.), **Cuprablau-Z** (0,8% konc.), **Cuprablau-Z Ultra** (0,7 % konc.), **Kupro 190 SC** (1% konc.), **Kocide 2000** (0,25% konc.), **Kocide DF** (0,5-0,7% konc.), **Nordox 75 WG** (0,15% konc.) ali **Bordojsko brozgo Caffaro** (0,95-1,15% konc.), samo v tistih nasadih breskev, ki že vstopajo v fazo brstenja. V primeru nočnih temperaturah pod 0 °C s škropljenjem z bakrovimi pripravki, zaradi nevarnosti nastanka ožigov, počakajte do otoplitve. Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za dobro omočenost celotne površine dreves.

Če so breskve in nektarine še v fazi mirovanja s škropljenjem ne hitite. O optimalne času škropljenja vas bomo pravočasno obvestili.

Datum objave obvestila: 21.02.2014 10:17

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

