

#### 14. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE - 18.03.2014 16:24 - Zaključeno



Razvoj oljne ogrščice napreduje počasi. Opazimo lahko razvite cvetne brste, ki so še vedno obdani z listi (razvojna stopnja 50 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem priporočamo pregled posevkov. V primeru opaženega **repičnega kljunotaja**, je praga škodljivosti presežena z 2 do 4 hroščki na 10 pregledanih rastlin. Za preprečevanje škode lahko uporabite eno od naslednjih sredstev: **KAISO EG**, **KARATE ZEON 5 CS**, **MAVRIK 240** ali **SPARVIERO**.

**Nanos zaščitnega sredstva opravite v času, ko čebele ne letajo in izvedite vse preventivne ukrepe potrebne za njihovo varstvo!**

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 18.03.2014 16:24

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)