



9. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 19.03.2014 10:56 - Zaključeno



Obvestilo dne. 19. 3. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Breskve in nektarine prehajajo iz **fenološke faze balona v fazo cvetenja E (BBCH 59 – 60)**, na najbolj sončnih legah pa imajo zgodaj cvetoče sorte že odprtih 10 – 20 % cvetov F (BBCH 61 – 62). Breskve in nektarine vstopajo v fenološko fazo cvetenja, zato pred padavinami, ko bo odprtih odprtih 10 % cvetov, opravite škropljenje proti **cvetni in plodovi moniliji** z enim od pripravkov kot so: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha), **Rovral aquaflo** (1,5 – 2,25 L/ha) ali **Topsin – M** (1 kg/ha).

Mareljice so fazi od cvetenja. Samo v primeru obilnih padavin pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje mareljic proti **cvetni moniliji** z enim od pripravkov kot so: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha), **Rovral aquaflo** (1,5 – 2,25 L/ha), **Topsin-M** (1 kg/ha) ali **Duaxo koncentrat** (3,3 L/ha).

Datum objave obvestila: 19.03.2014 10:56

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

