



19. VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI - 21.03.2014 15:35 - Zaključeno



Pri pregledu posevkov opažamo v pšenici povečan pojav **listne pegavosti**. Prvo preventivno zatiranje je priporočljivo izvesti ob pojavu bolezni, pred padavinami, oz. v razvojnem stadiju pšenice 26 – 61 po BBCH (od razraščanja do začetka cvetenja). Uporabite lahko enega od naslednjih sredstev: **ARCHER MAX, ARCHER TOP 400 EC, BUMPER 25 EC, FALCON EC 460, PROPI 25 EC, ZAMIR.**

Dosedanje okoljske razmere so v posevkih ječmena omogočile okužbe z **ječmenovo mrežasto pegavostjo**. Prvo preventivno zatiranje je priporočljivo izvesti ob pojavu bolezni, pred padavinami, oz. v razvojnem stadiju ječmena 29 - 51 po BBCH (od razraščanja do začetka klasenja). Uporabite lahko enega od naslednjih sredstev: **AMISTAR EXTRA, ARCHER MAX, AMISTAR OPTI, ARCHER TOP 400 EC, OPUS 1, PROSARO, SPHERE 535 SC, TAZER 250 SC, ZAMIR.**

Opisi bolezni in lastnosti fitofarmaceutskih sredstev so podrobneje opisani v prispevku na spletni strani KGZS – Zavoda Novo mesto: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin>.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 21.03.2014 15:35

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)