

Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Oljna ogrščica
/ 20. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED REPIČNIM KLJUNOTAJEM IN REPIČARJEM IN BOLEZNIMI

20. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED REPIČNIM KLJUNOTAJEM IN REPIČARJEM IN BOLEZNIMI - 21.03.2014 15:36 - Zaključeno



Trenutno se večina posevkov še vedno nahaja v razvojnih stopnjah 50-51 (prisotni cvetni brst še vedno obdan z listi – cvetni brsti vidni od zgoraj ('zelen brst')) po lestvici BBCH.

Če pri pregledu posevkov opazite presežen prag pojava **repičnega kljunotaja** (dva vboda na posamezno rastlino ali 2-4 hroščke na 10 rastlin) priporočamo uporabite enega od naslednjih pripravkov: **DECIS EC 2,5, KAISO EG, KARATE ZEON 5 CS, MAVRIK 240** in **POLECI**.

Če ste zasledili prerasnmožitve **repičarja** (prag škodljivosti je 4-6 hroščkov na rastlino) imajo na omenjenega škodljivca stransko delovanje že navedeni pripravki za zatiranje kljunotaja. Če se odločite za samostojno zatiranje so za repičarja registrirani tudi naslednji pripravki: **BISCAYA, BULLDOCK EC 25, CHESS, FASTAC 10% SC, GAT DECLINE 2,5 EC** in **SPARVIERO**. Zatiranje je potrebno izvesti najpozneje tik pred začetkom cvetenja.

Škropljenje opravite v času, ko čebele ne letajo in izvedite vse preventivne ukrepe potrebne za njihovo varstvo!

Za zatiranje **suhe trohnobe stebra ogrščice** lahko insekticidu dodate enega od pripravkov: **CARAMBA, FOLICUR EW 250, PROPI 25 EC, TEBAZON EW 25**, ali **TEBUSCHA 25% EW**.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 21.03.2014 15:36

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

