



16. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 01.04.2014 08:30 - Zaključeno



Obvestilo dne. 1. 4. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Zgodnje sorte češenj prehajajo v fazo polnega cvetenja F<sub>2</sub> (BBCH 64) medtem, ko so pozne sorte pravkar začele cveteti F (BBCH 60- 61). Višnje so v stadiju rdečega popka E (BBCH 57). Slive in češplje pa polno cvetijo. Trenutno suho vreme ne ustvarja pogojev za okužbe s cvetno monilijo, v primeru dežja pa bodo ti pogoji izpolnjeni. Zato škropljenje proti **cvetni moniliji** opravite pred napovedanim padavinam.

Škropljenje **češenj in višenj** opravite z enim od pripravkov kot so: **Duaxo koncentrat** (3,3 L/ha), **Teldor SC 500** (0,5 L/ha), **Topsin – M** (1 kg/ha) ali **Rovral aquaflo** (1,5 L/ha).

Za škropljenje **sliv in češpelj** pa uporabite enega od pripravkov kot so: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha), **Octave** (400 g/ha), **Teldor SC 500** (0,5 L/ha), **Topsin – M** (1 kg/ha) ali **Rovral aquaflo** (1,5 L/ha).

V primeru, da na bele lepljive plošče lovite več kot 30 osic rumene in črne češpljeve grizlice, po končanem cvetenju opravite škropljenje proti omenjeni škodljivki z insekticidom **Mospilan 20 SG** (0,04 % konc.). Češpljeve grizlice povzročajo zgodnjo črvičnost plodov.

Datum objave obvestila: 01.04.2014 08:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)