



51. VARSTVO KORUZE PRED PLEVELI ŠT. 2 - 29.04.2014 14:24 - Zaključeno



Strategija zatiranja plevelov v koruzi se v zadnjih letih nagiba zlasti k uporabi herbicidov po vzniku posevka. V ta namen priporočamo, da omejite uporabo talnih herbicidov le na površinah, ki ne predstavljajo tveganja za podtalnico.

Po vzniku koruze od razvojne faze 2 do 7 listov (BBCH 12 ~) lahko uporabite enega izmed naslednjih herbicidov:

pred vznikom do 3 listov: **ACTIVUS 40 WG** (4 kg/ha), **CAMIX** (3,75 l/ha), **LUMAX** (pripravek se lahko uporablja na VVO pod določenimi pogoji, poglejte navodila za uporabo, 3-4 l/ha);

- po vzniku do 7 listov: **CALLISTO 480 SC** (0,15-0,25 l/ha);
- po vzniku do 4 listov: **STOMP 400 SE** (3-4 l/ha), **STOMP AQUA** (2,9 l/ha), **SUCCESSOR 600** (2 l/ha);
- od 1 – 7 listov: **BASAGRAN 480** (1,5-2 l/ha), **ELUMIS** (1,5 l/ha), **PEAK 75 WG** (20-30 g/ha);
- 2 – 3 liste: **BROMOTRIL 225 EC** (1 – 1,5 l/ha);
- 2 – 5 listov: **LONTREL 100** (1 – 1,2 l/ha);
- 2 – 6 listov: **AKRIS** (3 l/ha), **ALISEO PLUS** (350 – 440 g/ha), **ARRAT** (0,2 kg/ha), **EQUIP** (2 – 2,25 l/ha), **MAISTER OD** (1,5 l/ha),
- 2 – 7 listov: **ALISE** (70 g/ha), **ARIGO** (330 g/ha), **CAMBIO** (2 – 3 l/ha), **HARMONY 50 SC** (22,5 g/ha), **LAUDIS** (1,15 – 2,25 l/ha), **LAUDIS WG 30** (0,25 – 0,5 kg/ha), **MILAGRO EXTRA 6 OD** (0,75 l/ha), **MILAGRO 240 SC** (170 ml/ha), **MOTIVEL EXTRA 6 OD** (0,75 l/ha), **SAMSON EXTRA 6 OD** (0,75 l/ha), **TAROT 25 WG** (50 – 60 g/ha).
- 3 – 4 listi: **HERBOCID** (1 – 1,5 l/ha)
- 3 – 6 listov: **BANVEL 480 S** (0,4 – 0,6 l/ha), **BANVEL 4 S** (0,4 – 0,7 l/ha), **CASPER** (0,3 – 0,4 kg/ha), **ENTAIL** (170 ml/ha), **GAT STAKE 20 EC** (1 l/ha), **KELVIN** (1 l/ha), **MOTIVELL** (1 – 1,2 l/ha), **NICOSH** (1 l/ha), **SAMSON 4 SC** (1 – 1,2 l/ha), **TANDUS 200 EC** (1 l/ha), **TOMIGAN 200 EC** (0,8 l/ha),
- 4 – 5 listov: **ESTERON** (1 l/ha), **MUSTANG 306 SE** (0,5 – 0,6 l/ha), **STARANE 2** (0,8 l/ha),

Podrobnejše obvestilo o zatiranju plevelov in lastnostih herbicidov ter njihovem optimalnem času uporabe, si lahko preberete na spletni strani KGZS – Zavoda Novo mesto: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin> (Herbicidi v koruzi 2014).

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 29.04.2014 14:24

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)