



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Žita
/ 60. VARSTVO PŠENICE PRED GLIVIČNIMI BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

60. VARSTVO PŠENICE PRED GLIVIČNIMI BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 09.05.2014 18:47 -
Zaključeno



Pšenica je v fazi klasenja (BBCH 51 ~). V posevkih še vedno opažamo presežene pragove žitne pepelovke, pšenične rje in listne pegavosti. V času klasenja in cvetenja je primeren čas za zatiranje **fuzarioze**. Pri izbiri sredstev se osredotočite predvsem na tiste, ki imajo hkrati še vedno delovanje na zgoraj omenjene glivične bolezni. V poštev pridejo naslednji pripravki: **AMISTAR EXTRA** (0,6 – 1 l/ha), **EMINENT 125 EW** (0,8 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,5 l/ha), **IMPACT** (1 l/ha), **PROSARO** (1 l/ha). V času cvetenja lahko uporabite še: **CARAMBA** (1,5 l/ha), **FALCON EC 460** (0,6 l/ha), **OPUS 1** (1 – 1,5 l/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 l/ha), **TEBUSA 25%EW** (1 l/ha), **TOPSIN – M** (1,1 kg/ha), **ZAMIR** (1,5 l/ha).

V posevkih pšenice je trenutno možno opaziti odrasle osebkke **rdečega žitnega strgača** z nekaj odloženimi jajčeci. Za zatiranje se odločite, ko bo dosežen prag škodljivosti: ena ličinka na posamezen vrhni list ali 10 ličink na m² ali poškodovane vsaj 15% površine najbolj vitalnih zgornjih listov. Izberete eno izmed naslednjih sredstev: **BISCAYA** (0,3 l/ha), **BULLDOCK** (0,3 – 0,5 l/ha), **DECIS** (0,2 – 0,3 l/ha), **DECIS 2,5 EC** (0,2 – 0,3 l/ha), **FASTAC** (0,125 l/ha), **GAT DECLINE 2,5 EC** (0,2 – 0,3 l/ha), **KAISO EG** (150 g/ha), **KARATE ZEON 5 CS** (0,15 l/ha), **MAVRIK 240 EW** (0,2 l/ha), **POLECI** (0,2 – 0,3 l/ha) in **SPARVIERO** (0,075 l/ha).

Razvoj **žitnih uši** je v polnem razmahu. Prag je presežen, ko v času cvetenja na klas najdete več kot 5 do 8 uši ali je z ušmi naseljenih več kot 20% klasov oziroma, ko v času mlečne zrelosti na klasu najdete 7 do 10 uši ali ko imate z ušmi naseljenih več kot 30 % klasa. Za zatiranje uši so dovoljena naslednja sredstva: **BISCAYA** (0,3 l/ha), **BULLDOCK** (0,3 – 0,5 l/ha), **DECIS** (0,2 – 0,3 l/ha), **DECIS 2,5 EC** (0,2 – 0,3 l/ha), **GAT DECLINE 2,5 EC** (0,2 – 0,3 l/ha), **KAISO EG** (150 g/ha), **KARATE ZEON 5 CS** (0,15 l/ha), **MAVRIK 240 EW** (0,2 l/ha), **PERFEKTHION** (0,5 l/ha), **PIRIMOR 50 WG** (0,3 kg/ha), **POLECI** (0,2 – 0,3 l/ha), **SPARVIERO** (0,075 l/ha) in **TEPPEKI** (0,14 kg/ha).

Uporabo insekticida načrtujte sočasno z uporabo fungicidov. Pri izbiri insekticida se je v trenutnem obdobju nestanovitnega vremena in oslabiljene populacije rdečega žitnega strgača bolj smiselno odločati za tiste pripravke, ki delujejo na oba škodljivca in ki imajo sistemsko delovanje (npr. a. s.: tiakloprid).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih oprasovalcev.

Datum objave obvestila: 09.05.2014 18:47

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

