



66. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 16.05.2014 18:22 - Zaključeno



Vinska trta izredno intenzivno prirašča in je v trenutnem obdobju v oblikovanju socvetja. Razvoj je glede na lege in sortiment še vedno neizenačen, z dolžino mladik večinoma med 50 – 75 cm ter 9 in več razvitimi listi.

Prve peronosporne pege so se posamično začele pojavljati s koncem prve dekade maja. Dinamika razvoja trsov in vremenska prognoza za naslednje dni usmerjata varstvo pred **peronospora vinske trte** v uporabo kombiniranih in sistemsko delujočih pripravkov. Svetujemo uporabo sredstev kot so: **VALIS F** (1,5 kg/ha; le za vinsko grozdje), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM** (4 kg/ha), **PROFILER** (3 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha; le za vinsko grozdje), **MELODY DUO WG 66,8** (2 – 2,5 kg na ha), **MELODY COMBI WG 65,3** (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **ANTRACOL COMBI** (2 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,25 kg/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **GETT** (1,6 kg/ha), **PERGADO MZ** (1,6 kg/ha), **PERGADO – F** (1,6 kg/ha),...

Za zaščito proti **oidiji vinske trte** lahko uporabite: **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **VIVANDO** (0,16 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha),... Dodajanje pripravkov na osnovi žvepla do stabilnejšega dviga temperatur nad 15°C ni smiselno.

Razmiki med tretiranjmi naj bodo ob trenutnem razvoju trte na 7, do največ 10 dni.

*Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.*

Datum objave obvestila: 16.05.2014 18:22

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS