

## 68. VARSTVO KAPUSNIC - 16.05.2014 18:26 - Zaključeno



Pridelovalce zelja, brokolija in cvetače obveščamo, da smo na feromonskih vabah zasledili prve ulove **kapusovega molja**. Napadu so najbolj izpostavljene majhne rastline, ličinke namreč največ škode naredijo z objedanjem mladih listov. Zaradi poškodb rastline ne morejo tvoriti glav. Pri pregledu rastlin bodite pozorni na njihovo prisotnost. Nižje stadije ličink boste našli na povrhnjici listov, višje razvite pa se večinoma zadržujejo na spodnji strani listov. V primeru preseženega praga škodljivosti, ki je 1 gosenica na rastlino, lahko uporabite pripravke: **AFFIRM** (1,5 kg/ha, uporaba dovoljena na rastlinah, ki so že začele tvoriti glavo), **FASTAC 10 SC** (0,1 l/ha, ni za cvetačo), **KARATE ZEON 5 CS** (0,15 l/ha, samo za brstični ohrovt, zelje in redkvico), **LEPINOX PLUS** (1,0 kg/ha, ni za cvetačo), **MIMIC** (0,3 – 0,4 l/ha), **NEEMAZAL – T/S** (3,0 l/ha) ali **STEWART** (85 g/ha, uporablja se med fazo izleganja jajčec ali na začetku razvoja ličink). Pripravka Lepinox plus in Neemazal – T/S sta dovoljena tudi za ekološko pridelavo. Za boljše delovanje pripravkov priporočamo dodajanje močila.

*Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.*

Datum objave obvestila: 16.05.2014 18:26

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)