

40. Resarji na čebulnicah - 10.06.2014 15:15 - Zaključeno



V nasadih čebule, česna in pora bodite pozorni na pojave resarjev (*Thrips sp.*). Preverite njihovo navzočnost na mestu, kjer listi izraščajo. Razvoju škodljivcev zelo ustreza suho vreme in visoke temperature. Prehranjujejo se z rastlinskimi sokovi, prenašajo številne viruse in povzročajo poškodbe na listih, ki so lahko vdorna mesta za različne glivične ali bakterijske povzročitelje bolezni. Zatiranje škodljivcev je potrebno opraviti v začetnem obdobju pojavljanja žuželk, takoj po izleganju ličink, preden se njihova populacija zelo namnoži. Opraviti je potrebno 2 do 3 zaporedna škropljenja v razmakih 5 do 7 dni, s čimer se prekine razvojni krog škodljivca. Škropivu dodajte močilo za boljšo oprijemljivost. Za zatiranje resarjev v čebuli sta registrirana pripravka **Laser 240 SC** in **Perfekthion**, v česnu **Perfekthion**, v poru pa **Laser 240 SC** in **Karate Zeon 5 CS**. **Obvezno upoštevajte sredstvom priložena navodila!**

Datum objave obvestila: 10.06.2014 15:15

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko

Priprava: **Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj**

[Seznam registriranih FFS](#)