



106. VARSTVO PLODOVK - 04.07.2014 16:25 - Zaključeno



V nasadih paradižnika opazamo povečan pojav **paradižnikove plesni** in **črne listne pegavosti**. Za zaščito rastlin priporočamo uporabo pripravkov, ki delujejo na obe bolezni hkrati: **ACROBAT MZ WG** (2 kg/ha; 3 dni karence), **BANKO 500 SC** (2 l/ha; 3 dni karence), **FORUM MZ WG** (2 kg/ha; 3 dni karence), **GETT** (2 – 2,5 kg/ha; 17 dni karence), **PERGADO MZ** (2 – 2,5 kg/ha; 3 dni karence), **QUADRIS** (1 kg/ha; 3 dni karence), ... Tretiranje je trenutno tehtno le na paradižniku gojenem na prostem. V zaščitnih prostorih poskrbite, da so rastline zadostno prezračene in imajo zagotovljeno dovolj široko medvrstno razdaljo, kar dosežete z rednim odstranjevanjem zalistnikov.

Pridelovalce paprike v zaprtih prostorih opozarjamo na prerazmnožitev **resarjev**. Za zaščito pridelka lahko uporabite **CONFIDOR 200 SL** (0,75 l/ha, 7 dni karence), **KARATE ZEON 5 CS** (0,15 l/ha, 3 dni karence), **KOHINOR SL 200** (0,75 l/ha, 7 dni karence) ali **AKTIV** (3%, ČU), **BIOTIP FLORAL** (1,25 – 1,6 l/ha, 3 dni karence), **FLORA VERDE** (1,25 – 1,6 l/ha, 3 dni karence), **LASER** (0,4 l/ha, 3 dni karence), **RAPTOL KONCENTRAT** (10 l/ha, 3 dni karence), **VALENTIN EKO insekticid iz maščobnih kislin** (100%, 4 dni karence),... Sredstva na osnovi spinosada, piretrina in kalijevih soli maščobnih kislin so dovoljena za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 04.07.2014 16:25

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

Seznam registriranih FFS