



114. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 09.07.2014 08:42 - Zaključeno



Vinska trta je po razvoju grozdov na stopnji jagod velikosti graha (grozdiči povešeni) do začetka dotikanja jagod (75 – 77 po lestvici BBCH).

V vinogradih so razmere za širjenje glivičnih okužb zaradi nestanovitnega vremena zelo ugodne. Vinogradnikom za zaščito pred **peronosporo vinske trte** še vedno priporočamo kombinirane pripravke kot so **ANTRACOL COMBI** (2 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (0,4 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 – 2 kg/ha), **CURZATE M** (2 – 3 kg/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha) in druge... V vinogradih z močnejšo rastjo je smiselno uporabiti pripravke v kombinaciji z bakrom: **CURZATE R** (2-3 kg/ha), **GALBEN C** (4-5 kg/ha) ali preventivni **AMALINE FLOW** (2,25 L/ha), oz. **PERGADO C** (4-5 kg/ha). Ob pojavih toče poskrbite za čim prejšnjo zaščito. Prednost dajemo pripravkom na osnovi a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga Extra WDG, Fantic F, Pergado – F, Valis F, Emendo F, Melody combi WG 65,3, Ridomil Gold combi Pepite, ...).

Za varstvo pred **oidijem vinske trte** uporabite pripravek **NATIVO 75 WG** (0,18 kg/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **FALCON EC 460** (0,3 – 0,4 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,03%), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,3 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 /ha), ali druge... Dodate lahko še **pripravke na osnovi žvepla**.

Do zapiranja grozdnih jagod v grozd je tudi čas za preventivno zaščito pred **sivo grozdno plesnijo**. Pripravke kot so **PYRUS 400 SC** (2 l/ha), **MYTHOS** (2,5 l/ha), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha), **ROVRAL AQUAFLO** (1,5 l/ha), **CANTUS WG** (1,2 kg/ha), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (1-1,5 l/ha) ali **BOTECTOR** (0,4 kg/ha) nanesete le v predelu grozdja.

Kvalitetnejši nanos in boljše razporejanje sredstev omogoča dodajanje močil kot **BREAK THRU S 240**, **ETALFIX-PRO** ali **SILWET L-77** (porabo vode je potrebno zmanjšati za 30%), medtem ko zagotavlja **NU-FILM 17** boljšo oprijemljivost v primeru obilnejših padavin.

Razmiki med tretiranjimi naj bodo na 10 do 12 dni.

V ekološki pridelavi je za varstvo pred **peronosporo vinske trte** predvidena uporaba **bakrovih pripravkov** (možnost posameznih preverite še pri kontrolni organizaciji).

Zoper **oidij vinske trte** lahko uporabite **VITISAN** (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Dobro deluje tudi **AQ – 10** (35 g/ha, na osnovi glive *Ampelomyces quisqualis*, katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo in zahteva najmanj 2 zaporedni tretiranjimi). Pripravki na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA** (3-4 kg/ha) dosegajo boljše delovanje ob redni uporabi na krajše časovne razmike (~5 dni), lahko pa pristopite tudi s prašenjem **ELEMENTARNEGA ŽVEPLA** (18-20 kg/ha).

Preventivno zaščito pred **sivo grozdno plesnijo** opravite v predelu grozdja na osnovi antagonističnega delovanja glive *Aureobasidium pullulans* s sredstvom **BOTECTOR** (0,4 kg/ha), ki ga lahko do konca zorenja preventivno uporabite do 4 krat.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 09.07.2014 08:42

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

