

## 118. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 16.07.2014 07:23 - Zaključeno



Vinogradnikom za zaščito pred *peronospora vinske trte* v primeru resnejših okužb še vedno priporočamo kombinirane pripravke kot so **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **ANTRACOL COMBI** (2 kg/ha), **EQUATION PRO** (0,4 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 – 2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha) in druge... Ob pojavih toče poskrbite za čim prejšnjo zaščito s sredstvi na osnovi a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga Extra WDG, Fantic F, Pergado – F, Valis F, Emendo F, Melody combi WG 65,3, Ridomil Gold combi Pepite,...).

Za varstvo pred *oidijem vinske trte* uporabite **FALCON EC 460** (0,3 – 0,4 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,03%), **NATIVO 75 WG** (0,18 kg/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIUS 25 EW** (0,3 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), ali druge... Dodate lahko še **prepravke na osnovi žvepla**.

Razmiki med tretiranjimi naj bodo na 10 do 12 dni.

V ekološki pridelavi je za varstvo pred *peronospora vinske trte* predvidena uporaba **bakrovih pripravkov**.

Zoper *oidij vinske trte* lahko uporabite **VITISAN** (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Dobro deluje tudi **AQ – 10** (35 g/ha, na osnovi glive *Ampelomyces quisqualis*, katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo in zahteva najmanj 2 zaporedni tretiranjimi). Pripravki na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA** (3-4 kg/ha) dosegajo boljše delovanje ob redni uporabi na krajše časovne razmike (~5 dni), lahko pa pristopite tudi s prašenjem **ELEMENTARNEGA ŽVEPLA** (18-20 kg/ha).

Priporočamo še redno preventivno zaščito pred *sivo grozdno plesnijo*, ki jo opravite v predelu grozdja na osnovi antagonističnega delovanja glive *Aureobasidium pullulans* s sredstvom **BOTECTOR** (0,4 kg/ha; do 4 krat v rastni dobi), katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opravevalcev.**

Datum objave obvestila: 16.07.2014 07:23

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

