



129. ZATIRANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE - 29.07.2014 09:28 - Zaključeno



Imetnike zemljišč obveščamo, da morajo na podlagi *Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia* (Uradni list RS, 63/10), odstraniti škodljive rastline **pelinolistne ambrozije** s koreninami vred ali odstraniti nadzemni del na način, da se ne obraste več. Ker so škodljive rastline iz rodu *Ambrosia* v Sloveniji zelo razširjene, je ukrepe obvladovanja potrebno izvajati ne samo na kmetijskih, temveč tudi na nekmetijskih zemljiščih. Da preprečimo širjenje rastlin ambrozije z nekmetijskih na kmetijske površine, moramo ukrepati preden rastline preidejo v fazo cvetenja.

S puljenjem mladih rastlin preden se le-te močno ukoreninijo lahko rastline 100 % učinkovito zatremo. Če izvajamo puljenje, ga je potrebno izvesti ko so rastline manjše in ga ponavljati vse dokler vznikajo nove rastline. Ne cvetoče izpuljene rastline skupaj s prstjo na koreninah zberemo v plastičnih vrečkah, ki jih nato oddamo k ustreznim odpadkom (smeti, kompost ali gnojšča) ali pa jih zažgemo. Ostanke rastlin, ki so že oblikovale seme ni priporočljivo odlagati na kompost, gnojšča ali v zabojnike za smeti. Priporočamo sežig, seveda v okviru možnosti in predpisov, ki omejujejo kurjenje v naravi in v urbanem okolju.

Mulčenje lahko uporabimo kot ukrep za omejevanje kaljenja semen na majhnih površinah, npr. na gradbiščih in nekaterih drugih nekmetijskih površinah.

Na večjih površinah izvajamo košnjo s ciljem preprečevanja tvorjenja semen in izčrpavanja rastlin. Košnja oz. rezanje naj poteka čim bližje tal tako, da zmanjšamo možnost obraščanja, vendar brez poškodb na površini tal. Zatravljene površine ob cestah bi naj prvič kosili v začetku junija, ko je večina rastlin že vzniknila, drugo košnjo izvedemo tik pred začetkom cvetenja rastlin (začetek avgusta), zadnja košnja pa bi morala biti vedno izvedena preden dozori seme (od septembra do oktobra).

Na **kmetijskih površinah**, v posevkih koroze so za zatiranje ambrozije registrirani naslednji pripravki, ki se jih lahko na isti površini uporabi največ enkrat v rastni sezoni: **BANVEL 4 S** (0,5 - 1,0 l/ha), **CAMBIO** (2 - 3 l/ha), **MUSTANG 306 SE** (0,5 do 0,6 l/ha), **EQUIP** (2 do 2,5 l/ha), **HARMONY 75 WG** (20-30 g/ha ob dodatku močila), **PEAK 75 WG** (20 - 30 g/ha), **CASPER** (0,4 kg/ha) ali **ELUMIS** (1,5 l/ha).

Za zatiranje pelinolistne in drugih vrst ambrozije (*Ambrosia* sp.) na **zatravljenih nekmetijskih** zemljiščih, so registrirani naslednji herbicidi s katerimi se lahko tretira največ enkrat v isti rastni dobi: **BANVEL 4 S** (0,5 - 1,0 l/ha), **CALLISTO 480 SC** (0,25 l/ha), **HARMONY 75 WG** (20-30 g/ha). Navedeni herbicidi so namenjeni za zatiranje ambrozije na zatravljenih nekmetijskih površinah (brežine avtocest; železnice; 1,5 m pas ob regionalnih cestah; urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene ter drugih). Ob tretiranju je potrebno preprečiti zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline ter vstop na sveže poškropljene površine. Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se priporoča škropljenje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin.

Več osnovnih informacij je dostopnih na straneh UHVVR: http://www.uvhvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/ in Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin>.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 29.07.2014 09:28

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

Seznam registriranih FFS

