

132. VARSTVO BUČNIC - 01.08.2014 15:29 - Zaključeno



Vreme z obilico padavin je povečalo možnost za okužbe s **kumarno plesnijo** na kumarah. Za varstvo pridelka lahko uporabite: **ALLIETE** (4 kg/ha, 4 dni karence), **ALLEATO 80 WG** (1 – 4 kg/ha, 3 dni karence), **GETT** (2 – 2,5 kg/ha, 5 dni karence), **ORTIVA** (1 l/ha, 3 dni karence), **QUADRIS** (0,075 %, 3 dni karence), **PERGADO MZ** (2 – 2,5 kg/ha, 5 dni karence), **REVUS** (0,6 l/ha, 3 dni karence), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (3 kg/ha, 5 dni karence) ali **ANTRACOL** (0,3 %, 7 dni karence), **ENERVIN** (1,5 kg/ha, 7 dni karence).

Za zatiranje **pepelovk bučnic** (*Erysiphe orontii*, *Sphaerotheca fusca*) na kumarah, bučah in dinjah lahko uporabite enega izmed naslednjih sredstev: **DUAXO KONCENTRAT** (bučka, kumara: 1%, 3 dni karence), **KARATHANE GOLD 350 EC** (buča, dinja, kumara: 0,04 – 0,06%, 3 dni karence), **ORTIVA** (bučka 1 l/ha, dinja, navadna kumara: 0,48 – 0,96 l/ha, 3 dni karence), **QUADRIS** (bučnice 0,075%, 3 dni karence). Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi žvepla, pozorni bodite na možnost pojava fitotoksičnosti, ki se lahko pojavijo pri temperaturah višjih od 28°C. Ti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Presledke med škropljenji prilagajajte vremenskim razmeram, naj pa ne bodo daljši od 10 dni.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja.**

Datum objave obvestila: 01.08.2014 15:29

Obvestilo prognozičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

