



133. VARSTVO PLODOVK - 01.08.2014 15:30 - Zaključeno



Obilica padavin ustvarja pogoje za razvoj in širjenje številnih glivičnih obolenj.

Za zaščito paradižnika pred **paradižnikovo plesnijo** in **črno listno pegavostjo** priporočamo: **ACROBAT MZ WG** (2 kg/ha; 3 dni karence), **PERGADO MZ** (2 – 2,5 kg/ha; 3 dni karence), **FORUM MZ WG** (2 kg/ha; 3 dni karence), **BANKO 500 SC** (2 l/ha; 3 dni karence), **GETT** (2 – 2,5 kg/ha; 17 dni karence), **QUADRI** (1 kg/ha; 3 dni karence),... Tretiranje je priporočeno pri gojenju na prostem in v zaščiteneh prostorih. V zaščiteneh prostorih poskrbite, da so rastline zadostno prezračene in imajo zagotovljeno dovolj široko medvrstno razdaljo, kar dosežete z rednim odstranjevanjem zalistnikov.

V zaščiteneh prostorih, ki so slabo prezračeni, prihaja na rastlinah paprike do pojava **sive plesni**. Za zaščito lahko uporabite pripravke **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha, 3 dni karence) ali **ROVRAL AQUAFLO** (1,5 – 2,2 l/ha, 15 dni karence).

Za preventivno zaščito paradižnika pred **sivo plesnijo** so na voljo sredstva: **ROVRAL AQUAFLO** (1,5 – 2,2 l/ha, 3 dni karence), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha, 3 dni karence) ali **TELDOR SC 500** (1 – 2 kg/ha, 3 dni karence).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja.

Datum objave obvestila: 01.08.2014 15:30

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)