

### 3. Varstvo koščičarjev - 24.03.2015 09:06 - Zaključeno



Nizke nočne temperature še naprej vplivajo na počasno odganjanje koščičarjev, ki so večinoma še v fazi brstenja, razen marelic in breskev v toplejših legah, ki že cvetijo.

V obdobju brstenja drevja je čas za uporabo bakrovih pripravkov, ki delujejo na številne glivične in bakterijske bolezni. Uporabite lahko katerega izmed naštetih pripravkov: **Champion 50 WG**, **Cuprablau Z 35 WP**, **Cuprablau Z ultra WP**, **Cuproxat**, **Bordojska brozga caffaro**, **Biotip bakrov fungicid plus**, **Kocide 2000**, **Kocide DF** ali **Nordox 75 WG**.

#### Škropljenje opravite pred dežjem!

Kjer breskve in nektarine že cvetijo jih lahko zavarujete pred breskovo kodravostjo in luknjičavostjo s pripravkom **Ziram 76 WG** ali **Syllit 400 SC**.

Za varstvo pred monilijami pa cvetoče drevje zavarujte z enim izmed pripravkov kot je: **Topsin M**, **Duaxo koncentrat**, **Switch 62,5 WG**, **Chorus 50 WG**, **Rovral aquaflo**, **Prolectus** ali **Teldor SC 500**. **Škropljenje opravite pred dežjem!**

Datum objave obvestila: 24.03.2015 09:06

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko

Uredil: **Vojko Škerlevaj**

[Seznam registriranih FFS](#)

