

## 65. VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 28.05.2015 14:20 - Zaključeno



Krompir je na območju JV Slovenije večinoma v fenofazi od pojava **socvetja do cvetenja (BBCH 55 – 69)**.

Vremenske razmere za razvoj **krompirjeve plesni** so v zadnjem obdobju izredno ugodne. V posevkih so prisotne že prve okužbe. Po končanem deževju vam priporočamo, da jih pregledate in tam kjer vrste še niso sklenjene in bolezen še ni prisotna uporabite enega izmed *kontaktnih pripravkov*: **ANTRACOL\***, **ANTRACOL WG 70\***, **BANKO 500 SC\***, **DITHANE DG Neotec\***, **MANKOZ 75 WG\***, **DITHANE M-45**, **ENERVIN**, **FROWNCIDE**, **GETT**, **MANFIL 75 WG**, **MANFIL 80 WP**, **PENNCOZEB 75 DG**, **PERGADO MZ\***, **PINOZEB M-45**, **POLYRAM DF**, **RANMAN TOP** (uporablja se tudi v času uporabe polsistemikov in sistemikov), **RANMAN TWINPACK**, **REVUS\***, **SHIRLAN 500 SC**, **WINBY**, ... V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

Pri krompirju sajenem bolj zgodaj oz. v posevkih kjer so prisotne že prve okužbe, priporočamo uporabo pripravkov s *sistemičnim ali polsistemičnim* delovanjem: **INFINITO**, **ACROBAT MZ WG\***, **ELECTIS 75 WG\***, **FORUM MZ**, **MOXIMATE 725 WP**, **VELOSTAR 725 WG**, **PROFILUX**, **NAUTILE DG**, **RANMAN TOP**, **RIDOMIL Gold MZ Pepite**, **SACRON 45 DG**, ...

Za zaščito ekoloških posevkov proti krompirjevi plesni uporabite **bakrene pripravke**.

Razmiki med škropljenji naj ne bodo daljši od 7-10 dni.

Pripravki označeni z \* so registrirani tudi za zatiranje **črne listne pegavosti krompirja**.

**Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.**

Datum objave obvestila: 28.05.2015 14:20

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

