

21. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 05.04.2016 18:59 - Zaključeno



Vinska trta je pričela z razvojem. Odvisno od lege in sortimenta, lahko zasledimo razpiranje luskolistov, brste v stadiju volne (modra frankinja in žametna črna) in na izpostavljenih legah (predvsem pri namiznih sortah) že odpiranje brstov z vidnimi konicami zelenih poganjkov (03-05 po lestvici BBCH).

Topli dnevi s temperaturami nad 16°C omogočajo uporabo žeplovih pripravkov: **THIOMT JET, KUMULUS DF, COSAN, PEPELIN WG, MICROTHIOL SPECIAL, VINDEK 80 WG**, ki v odmerku 3 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)**, učinkujejo na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo tudi proti **oidiju vinske trte**.

Razmiki med tretiranjimi naj bodo v tem obdobju na 8 do 10 dni.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.04.2016 18:59

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

