

## 27. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 08.04.2016 12:55 - Zaključeno



Razvoj vinske trte je ob dvigu temperatur zraka v preteklih dneh močno pospešil. Napredovanje je glede na lege in sorte še vedno precej raznoliko. Opaziti je stadij volne, do prevladujočega začetka odpiranja brstov in celo razprtega prvega lista (05-07-11 po lestvici BBCH).

Upoštevajoč razvoj trte in aktualno vremensko napoved, je potrebno ob odpiranju brstov poskrbeti za varstvo pred **črno pegavostjo vinske trte**. Na površinah, kjer se bolezen redno pojavlja, opravite dva nanosa fungicida. Prvič pristopite v času, ko mladike dosegajo do ~ 2 cm in naslednjič čez 7 do 10 dni, ko so že velike 5 – 10 cm. Nevarnost okužb se stopnjuje s prisotnimi padavinami, zato opravite preventivno zaščito še pred napovedanim dežjem. Svetujemo sredstva kot so: **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha) ali **POLYRAM DF** (3 kg/ha),...

Hkrati priporočamo dodajanje žveplovih pripravkov: **THIOVT JET**, **KUMULUS DF**, **COSAN**, **PEPELIN WG**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **VINDEX 80 WG**, ki v odmerku 3 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)**, učinkujejo na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo tudi proti **oidiju vinske trte**.

Razmiki med tretiranjimi naj bodo v tem obdobju na 7 do 10 dni.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 08.04.2016 12:55

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

