



33. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 15.04.2016 15:14 - Zaključeno



Vinska trta je po razvoju na stopnji razvoja listov (11-13 po lestvici BBCH).

Upoštevajoč razvoj trte in aktualne vremenske razmere, je potrebno ob odpiranju brstov poskrbeti za varstvo pred **črno pegavostjo vinske trte**. Na površinah, kjer se bolezen redno pojavlja, opravite dva nanosa fungicida. Prvič pristopite v času, ko mladike dosegajo ~ 2 cm in naslednjič čez 7 do 10 dni, ko so velike 5 – 10 cm. Nevarnost okužb se stopnjuje s prisotnimi padavinami, zato opravite preventivno zaščito še pred napovedanim dežjem. Svetujemo pripravke kot so:

FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha) ali **POLYRAM DF** (3 kg/ha),...

Hkrati priporočamo dodajanje žvepla v obliki: **THIOVT JET**, **KUMULUS DF**, **COSAN**, **PEPELIN WG**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **VINDEX 80 WG**, kateri v odmerku 3 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)**, učinkujejo na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo tudi proti **oidiju vinske trte**.

Razmiki med tretiranjmi naj bodo v tem obdobju na 7 do 10 dni.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 15.04.2016 15:14

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

