

## 52. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 13.05.2016 15:29 - Zaključeno



Vinska trta je v razvoju petega do osmega lista (15-18 po lestvici BBCH). Vremenske razmere so v trenutnem obdobju pogostih padavin zelo naklonjene razvoju glivičnih obolenj.

Vinogradnike obveščamo, da so pogoji za primarno okužbo s *peronosporo vinske trte* že izpolnjeni in kjer v času od pozebe še ni bila opravljena zaščita, je potrebno poskrbeti za uporabo preventivno delujočih fungicidov. Uporabite lahko sredstva kot so: **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2,0 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2,0 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2,0 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2,0 kg/ha), **PENNZOZEB 75 DG** (2,0 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (2 l/ha), **POLYRAM DF** (do 2,4 kg/ha). Kjer ste predhodno že uporabili pripravek na osnovi fosetil-Al: **MOMENTUM F** (3 kg/ha) ali **MIKAL FLASH** (3 kg/ha), z njegovo uporabo nadaljujte v skladu z navodili.

Pri varstvu pred *oidijem vinske trte* morajo biti za rabo **PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA** zadosti visoke temperature zraka (vsaj 15 °C). Uporabite lahko tudi sredstva kot sta **QUADRIS** (0,75-1,0 l/ha) ali **UNIVERSALIS** (2 l/ha; vinogradi za pridelavo vinskega grozdja), ki delujeta še na peronosporo vinske trte.

Pri trsih, ki so bili prizadeti zaradi pozebe, so ob rasti sekundarnih poganjkov možne prerazmnožitve *pršic*. Priporočamo pozorno spremljanje razvoja v času okrevanja prizadetih vinogradniških površin.

Razmike med tretiranjem prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m<sup>2</sup> 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja listnih gnojil in drugih preparatov, ki krepijo naravno odpornost rastlin. Uporaba slednjih bo smiselna šele v času ponovnega obraščanja trsov.

*Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.*

Datum objave obvestila: 13.05.2016 15:29

Obvestilo prognozičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

