

61. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 20.05.2016 15:44 - Zaključeno



Vinska trta je v razvoju petega do osmega lista (15-18 po lestvici BBCH). Vremenske razmere so v trenutnem obdobju pogostih padavin zelo naklonjene razvoju glivičnih obolenj.

Za zaščito pred *peronosporo vinske trte* je potrebno poskrbeti za preventivno zaščito z enim od pripravkov kot so: **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2,0 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2,0 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2,0 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2,0 kg/ha), **PENNZOZEB 75 DG** (2,0 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (2 l/ha), **POLYRAM DF** (do 2,4 kg/ha) ali **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Kjer ste predhodno že uporabili pripravek na osnovi fosetil-Al: **MOMENTUM F** (3 kg/ha) ali **MIKAL FLASH** (3 kg/ha), z njegovo uporabo nadaljujte v skladu z navodili.

Proti oidiju vinske trte je smiselno dodati **PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA** (3 kg/ha). Uporabite lahko tudi sredstva kot sta **QUADRIS** (0,75-1,0 l/ha; zaloge v uporabi do 31.01.2017) ali **UNIVERSALIS** (2 l/ha; vinogradi za pridelavo vinskega grozdja), ki delujeta še na *peronosporo vinske trte*.

Pri trsah, ki so bili prizadeti zaradi pozebe, so ob rasti sekundarnih poganjkov možne prerazmnožitve **pršic**, zaradi česar priporočamo pozornost spremljanje njihovega razvoja. V primeru močnejšega napada je možno uporabiti pripravek **VERTIMEC PRO** (0,1% konc., oz. največjem odmerku 1 l/ha).

Razmike med tretiranjem prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m² 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Fitofarmaceutska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja listnih gnojil in drugih preparatov, ki krepijo naravno odpornost rastlin. Uporaba slednjih bo smiselna šele v času ponovnega obraščanja trsov.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Datum objave obvestila: 20.05.2016 15:44

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

