

Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Krompir
/ 75. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA V KROMPIRJU

75. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA V KROMPIRJU - 06.06.2016 11:10 - Zaključeno



Prve odrasle osebkke **koloradskega hrošča** smo opazili že pred časom. Trenutno samice intenzivno odlagajo jajčeca, opaziti pa je tudi že prve izležene ličinke. Odraslih hroščev ne zatiramo. Ukrepati začnemo, ko imamo na več kot 20% grmov pred začetkom cvetenja razvitih 10 ličink prvega stadija / grm, ali ko imamo po višku cvetenja več kot 20 ličink na grm. Za zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **ACTARA 25 WG, ALVERDE, BISCAYA, BULLDOCK EC 25, CALYPSO SC 480, CORAGEN, LASER 240 SC, MAVRIK 240, MIDO 20SL, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN SG, MOKSYCAN 20 SG, NUPRID 200SC, SPARMIERO.**

V ekološki pridelavi krompirja lahko uporabite pripravek **NEEMAZAL T/S** ali pripravke na osnovi piretrina: **RAPTOL KONCENTRAT** in **RAPTOL SPRAY.**

Letno skušamo insekticide uporabiti le dvakrat. Vsakič uporabite insekticid iz druge kemične skupine. Pri zgodnjem krompirju bodite pozorni na karenčne dobe. Če uporabite dotikalne insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. V primeru uporabe sistemskih sredstev krompir zaščitimo za 3 – 5 tednov.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmaceutskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Datum objave obvestila: 06.06.2016 11:10

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

