

98. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 29.06.2016 13:34 - Zaključeno



Vinska trta je s cvetenjem popolnoma zaključila in nastavlja plodiče (71 po lestvici BBCH).

Nevarnost okužb s *peronospora vinske trte* je izredna. Pri zaščiti dajemo prednost kombiniranim in sistemsko delujočim pripravkom: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **MOXIMATE PLUS** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (2,5 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (1,25 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MELODY COMBI WG 65,3** (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha),...

Možnosti za okužbe z *oidijem vinske trte* se stopnjuje z razvojem vremena in oblikovanjem grozdličev. Svetujemo uporabo sredstev kot so: **FALCON EC 460** (0,3-0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1-1,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,3 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **CRYSTAL** (0,16 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,25 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **TEBUSH 25% EW** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha),...

Razmik med tretiranj naj v tem obdobju ne presega 8-10 dni; prilagodite ga prirastu ter količini in intenzivnosti padavin (obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m² padavin ali več).

Ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni **zlate trsne rumenice**, zatirate v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdh in ohišnicah med 27.06. in 07.07.2016 s pripravkom **ACTARA 25 WG** (v odmerku 200 g/ha, od razpoložljivih insekticidov ima največji učinek). Možna je tudi uporaba: **RELDAN 22 EC** (1,6 l/ha), **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha), **DECIS** (0,5 l/ha), **GAT DECLINE 2,5 EC** (0,5 l/ha) ali pripravkov na podlagi piretrina (**KENYATOX VERDE** [0,7-0,8 l/ha], **FLORA VERDE** [1,6 l/ha], **VALENTIN EKO INSEKTIKID IZ NARAVNEGA PIRETRINA KONCENTRAT** [0,7-0,8 l/ha] in **BIOTIP FLORAL** [1,6 l/ha]), a bo zaradi manjšega učinka posledično treba opraviti dodatna naknadna tretiranja. Če za prvo tretiranje uporabite drugo sredstvo kot **ACTARA 25 WG**, je potrebno tretiranje ponoviti v drugem napovedanem roku. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov. *V ekološki pridelavi* po končanem cvetenju uporabite pripravke na osnovi piretrina: **KENYATOX VERDE** (0,7-0,8 l/ha), **FLORA VERDE** (1,6 l/ha), **VALENTIN EKO INSEKTIKID IZ NARAVNEGA PIRETRINA KONCENTRAT** (0,7-0,8 l/ha) in **BIOTIP FLORAL** (1,6 l/ha) in morate opraviti naknadno, drugo tretiranje 5 do 7 dni po prvem, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebkov na rumeno lepljivo ploščo na teden. *V matičnih vinogradih* uporabite: **ACTARA 25 WG** (200 g/ha), **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha) ali pripravke na podlagi piretrina. *V matičnjakih* uporabite: **ACTARA 25 WG** (200 g/ha) ali **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha). *V trsnicah* uporabite: **ACTARA 25 WG** (200 g/ha), **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha) ali **GAT DECLINE 2,5 EC** (0,5 l/ha).

Za spremljanje odraslih osebkov ameriškega škržatka **namestite v vinograde rumene lepljive plošče**. Plošče namestite v senčne predele trsov, kjer se škržatek najraje zadržuje. V večjih vinogradih obesite vsaj eno ploščo na ha, v manjših 3 ali 4. Tudi *v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah* je spremljanje ameriškega škržatka s 3-5 rumenimi lepljivimi ploščami na ha obvezno. Plošče boste v juliju in začetku avgusta redno pregledovali in če pri tedenskem pregledu ugotovite ulov 4 ali več odraslih škržatkov, je potrebno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdh in ohišnicah opraviti še drugo tretiranje.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Opozorjamo, da je treba vsa fitofarmaceutska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmaceutskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14).

http://www.uvhvr.gov.si/fileadmin/uvhvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2013/Posebno_nadzorovani_organizmi/trsne_rumenice_in_ameriski_skrzatek/2016_Navodila_za_zatiranje_ameriske

Datum objave obvestila: 29.06.2016 13:34

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: Peterlin Andreja

Seznam registriranih FFS