



105. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 05.07.2016 13:40 - Zaključeno



Vinska trta razvija grozdčice, ki se začenjajo povešati. Grozdne jagode so do velikosti zrna graha (75 po lestvici BBCH).

Pojavi okužb s **peronosporo vinske trte** so pogosti in nevarnost širjenja bolezni je še vedno visoka. Pri zaščiti pridelka je poleg uporabe fitofarmaceutskih sredstev potrebno pozornost nameniti tudi ustreznim agrotehničnim opravilom. **Iz območja grozdja postopno odstranjujte liste in povečajte zračnost.** Pri tem pazite, da ne bo prišlo do sončnih ožigov. Kjer je rast prebujna, skrajšajte poganjke in s pomočjo bakrovih pripravkov umirite razvoj trte. Pri zaščiti dajemo še vedno prednost kombiniranim in sistemično delujočim pripravkom: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **MOXIMATE PLUS** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (2,5 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (1,25 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MELODY COMBI WG 65,3** (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha),... V vinogradih z bujnejšo rastjo lahko uporabite tudi pripravke v kombinaciji z bakrom: **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **GALBEN C** (4-5 kg/ha), **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **PERGADO C** (4-5 kg/ha).

Sočasno s peronosporo se pojavlja tudi **oidij vinske trte**. Svetujemo uporabo sredstev kot so: **FALCON EC 460** (0,3-0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1-1,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,3 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **CRYSTAL** (0,16 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,25 l/ha), **ORIU 25 EW** (0,4 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25%EW** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha),...

Razmik med tretiranjimi naj v tem obdobju ne presega 8-10 dni; prilagodite ga prirastu ter količini in intenzivnosti padavin (obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m<sup>2</sup> padavin ali več).

Pozorni bodite na razvoj grozdov in prvo uporabo botriticidnih pripravkov. Še preden se grozdne jagode strnejo in zaprejo grozd, svetujemo za prvo zaščito proti **sivi plesni** z uporabo pripravkov kot so: **CANTUS WG** (1,2 kg/ha), **PYRUS 400 SC** (2 l/ha), **ROVRAL AQUAFLO** (1,5 l/ha), **MYTHOS** (2,5 l/ha), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (1-1,5 l/ha), **TELDOR PLUS** (1-1,5 l/ha), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha) ali **BOTECTOR** (400 g/ha; na osnovi *Aureobasidium pullulans*; priporočena uporaba 3-4x), ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Navedena sredstva je smiselno nanesti le v predelu grozdja.

V zadnjih dneh poteka množičen nalet drugega rodu **grozdnih sukačev**. Svetujemo uporabo pripravka **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha) ali **DELFIN WG** (0,15 %), oz. **RUNNER 240 SC** (0,3 l/ha), **MIMIC** (0,6 l/ha), **CORAGEN** (150 ml/ha), **AFFIRM** (1,5 kg/ha), oz. kjer se pojavljajo tudi napadi **pršic VERTIMEC PRO** (1,0 l/ha).

Za spremljanje odraslih osebkov **ameriškega škržatka** namestite v vinograde rumene lepljive plošče. Plošče namestite v senčne predele trsov, kjer se škržatek najraje zadržuje. V večjih vinogradih obesite vsaj eno ploščo na ha, v manjših 3 ali 4. Tudi v *matičnih vinogradih, matičnjakih* in *trsnicah* je spremljanje ameriškega škržatka s 3-5 rumenimi lepljivimi ploščami na ha obvezno. Plošče boste v juliju in začetku avgusta redno pregledovali in če pri tedenskem pregledu ugotovite ulov 4 ali več odraslih škržatkov, je potrebno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajda in ohišnicah opraviti še drugo tretiranje.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.**

Datum objave obvestila: 05.07.2016 13:40

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Prilavil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)