

46. Varstvo krompirja - 18.06.2004 02:30 - Poslano



V večini nasadih krompirja so vrste že strnjene . Na Celjskem območju je bila prva kritična vrednost v nasadih, kjer je fenofaza vznika nastopila okrog 5. maja, dosežena v času med 5. in 8. junijem. Kritična vrednost na po dlagi katere priporočamo pripravke z sistemskim in lokalno sistemskim delovanjem na našem območju zaenkrat še ni bila dosežena! Glede na vremensko napoved kaže, da bodo v naslednjih dneh ugodne razmere za pojav te bolezni. Zato priporočamo, da v nasadih, kjer so vrste sklenjene in tam, kjer do sedaj še niste opravili škropljenja s kontaktnim fungicidom uporabite sedaj enega od sistemskih pripravkov kot je: **Galben M** , **Ridomil (R) MZ 72 WP** , **Melody duo** ali **Tattoo** . V nasadih, kjer vrste še niso strnjene uporabite enega od kontaktnih fungicidov.

Pripravili: A. Ferlež, mag. M. Rak-Cizej, M. Zmrzlak

Datum objave obvestila: 18.06.2004 02:30

Obvestilo prognošičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)

