



126. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 27.07.2016 14:09 - Zaključeno



Vinska trta zaključuje razvoj plodičev in večina grozdnih jagod se med seboj dotika (79 po lestvici BBCH).

Fenološki razvoj vinske trte se pozna tudi pri pojavih novih okužb s *peronosporo vinske trte*, ki so pričakovani predvsem na vršičkih, zalistnikih in drugih mlajših delih rastline. Možnost okužb je vezana na obilno jutranjo roso, občasne padavine ter bujnost rasti v vinogradih. Uporaba sredstev s kombiniranim delovanjem je smiselna predvsem na površinah, kjer opazite aktivne okužbe. Tam lahko za preprečevanje nadaljnje škode uporabite pripravke kot: ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha),... Za umirjanje prebujne rasti lahko izberete pripravke v kombinaciji z bakrom: **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **GALBEN C** (4-5 kg/ha), **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **PERGADO C** (4-5 kg/ha). V kolikor je rast umirjena in obsežnejših okužb ni prisotnih, priporočamo rabo preventivnih sredstev kot so: **MILDICUT** (4 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), oz. enostavnejše dotikalne pripravke: **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha).

Med tem pojavi *oidija vinske trte* na poznih legah še vedno predstavljajo nevarnost za pridelek. Svetujemo rabo pripravkov kot so: **DYNALI** (0,65 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,3 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **FALCON EC 460** (0,3-0,4 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1,25 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **CRYSTAL** (0,16 l/ha), ...

Razmik med tretiranjmi naj v tem obdobju ne presega 8-10 dni; prilagodite ga prirastu ter količini in intenzivnosti padavin (obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m² padavin ali več).

Vinogradnike hkrati obveščamo, da se odrasli osebki *ameriškega škržatka* pojavljajo v vinogradih Vinorodne dežele Posavje od sredine meseca julija. Učinkovitost preteklih zatiranj spremljajte z lovom na 3-4 rumenih lepljivih ploščah, obešenih v senčnem predelu trsov. V primeru preseženega praga (4 ali več odraslih škržatkov) je potrebno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdhah in ohišnicah tretiranje z insekticidom ponoviti. V primeru, da s težavo prepoznate ameriškega škržatka, se za pomoč pri prepoznavanju lahko obrnete tudi na Službo za varstvo rastlin na KGZS-Zavod Novo mesto.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Datum objave obvestila: 27.07.2016 14:09

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)