



129. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 09.08.2016 15:12 - Zaključeno



Vinska trta prehaja v zorenje grozdnih jagod (81 po lestvici BBCH). Pri sorti 'Modra frankinja' se začneja barvanje jagod, posamezna obarvanja so opazna tudi pri 'Žametni črnini'.

Varstvo pred **peronosporo vinske trte** je smiselno zaključiti s tretiranjem v naslednjih dneh s pripravki kot so: **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha; 28 dni), **DITHANE M-45** (2 kg/ha; 28 dni), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha; 28 dni), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha; 28 dni), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha; 28 dni), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha; 28 dni), **PENNCOZEB 75 DG** (2 kg/ha; 28 dni), **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha; 35 dni za vinsko grozdje). Kjer je rast še vedno bujna, lahko za zaključna tretiranja uporabite tudi **PRIPRAVKE NA OSNOVI BAKRA**: **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha; 21 dni), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha; 21 dni), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2 kg/ha; 21 dni), **CHAMPION 50 WG** (0,20 - 0,25 % konc. ; 21 dni), **CHAMP FORMULA 2 FLO** (2 l/ha; 21 dni), **KOCIDE 2000** (0,20 % konc. ; 35 dni), **CUPROXAT** (0,75 % konc. ; 28 dni) ali **BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS** (0,75 % konc. ; 28 dni).

Proti **oidiju vinske trte** dodajte sredstvo kot je: **DYNALI** (0,65 l/ha; 21 dni), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; 14 dni), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha; 21 dni za vinsko grozdje), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha; 14 dni), **TOPAS 100 EC** (0,3 l/ha; 28 dni) ali **TOPAZE** (0,3 l/ha; 28 dni), **ORIU 25 EW** (0,4 l/ha; 14 dni za vinsko grozdje), **TEBUSHA 25%EW** (0,4 l/ha; 14 dni), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha; 28 dni), **TALENDO** (0,25 l/ha; 28 dni), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha; 42 dni), **FALCON EC 460** (0,3-0,4 l/ha; 35 dni), **CRYSTAL** (0,16 l/ha; 30 dni za vinsko in 21 dni namizno grozdje), ...

Na belih sortah (npr. 'Kraljevina') opazamo prve pojave **sive plesni**, kateri so lahko posledica poškodb zaradi *grozdnih sukačev*, bodisi pokanja ob neenakomernem razvoju jagod. Priporočamo spremljanje zdravstvenega stanja in v primeru razvoja okužb ukrepanje s pripravki kot so: **CANTUS** (1,2 kg/ha; 28 dni), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha; 14 dni), **TELDOR SC 500** (1-1,5 l/ha; 21 dni za vinsko in 14 za namizno grozdje), **TELDOR PLUS** (1-1,5 l/ha; 21 dni za vinsko in 14 za namizno grozdje), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha; 21 dni), **MYTOS** (2,5 l/ha; 21 dni), **PYRUS 400 SC** (2 l/ha; 35 dni), **ROVRAL AQUAFLO** (1,5 l/ha; 21 dni) ali **BOTECTOR** (na osnovi *Aureobasidium pullulans*; 400 g/ha; karenca je zagotovljena s časom uporabe), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Nanos je potrebno opraviti le v predelu grozdja. Za boljše učinkovanje svetujemo dodatek **SILWET L-77** (največ 0,3 l/ha), **BREAK THRU S 240** (v 0,05-0,1% konc.) ali **ETALFIX-PRO** (0,1% konc.), ob uporabi katerih je potrebno zmanjšati porabo vode.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Datum objave obvestila: 09.08.2016 15:12

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

