

## 130. OBVESTILO ZA VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 09.08.2016 15:17 - Zaključeno



V nasadih jablan in hrušk dosegajo plodovi v povprečju 80 - 90 % končne velikosti (78 - 79 po lestvici BBCH). Obiranje zgodnjih sort jablan 'Gala' in 'Elstar' se predvideva v zadnji dekadi avgusta. Zorenje zgodnjih hrušk ('Viljamovka') je pospešeno – doseganje tehnološke zrelosti se predvideva od sredina avgusta.

Za zaključna tretiranja zgodnjih sort pred **skladišnimi boleznimi** pridejo v poštev pripravki s kratko varnostno dobo: **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha; karenca 14 dni; tretiranje na 7 dni), **BELLIS** (0,8 kg/ha; karenca 7 dni; tretiranje 2× zaporedoma na 7 – 12 dni; zadnji nanos 7 dni pred obiranjem) ali **GEOXE** (0,45 kg/ha; karenca 3 dni; tretiranje 2×; zadnji nanos 3 dni pred obiranjem).

Za zaščito nasadov s pozniimi sortami svetujemo sredstva proti okužbam z **jablanovim** in **hruševim škrlupom**, ki imajo učinek tudi na **skladiščne bolezni**: **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha; karenca: 28 dni), **ORTHOXIDE 80 WG** (2 kg/ha; karenca: 28 dni), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha) in **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha; oba karenca: 21 dni) ali tiram: **THIRAM 80 WG** (3,0 kg/ha; karenca: 35 dni), oziroma **ZATO PLUS** (le jablana; 1,9 kg/ha; karenca: 35 dni), **ZATO 50 WG** (le jablana; 150 g/ha; karenca: 21 dni; tretiranje 35 in 21 dni pred obiranjem), **FLINT** (le jablana; 150 g/ha; karenca: 21 dni; tretiranje 35 in 21 dni pred obiranjem)

Kjer se pojavljajo preraszmnožitve **rdeče sadne** in **navadne pršice**, nadzorujte njihove populacije s pripravkom **MASAI** (0,5 kg/ha; karenca: 7 dni) ali **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha; karenca: 7 dni), katera je potrebno uporabiti samostojno in pri temperaturah pod 25 °C.

Priporočamo tudi preglede plodov na napade **jabolčnega zavijača**. Na površinah, kjer se škoda pojavlja redno, oz. je presežen prag škodljivosti (1% napadenih plodov), uporabite pripravek **AFFIRM** (4 kg/ha; 7 dni karence).

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.**

Datum objave obvestila: 09.08.2016 15:17

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

