



131. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 12.08.2016 13:14 - Zaključeno



Vinska trta prehaja v zorenje grozdnih jagod (81 - 85 po lestvici BBCH).

Pri varstvu pred **oidijem vinske trte** za zadnja tretiranja uporabite enega od pripravkov kot so: **DYNALI** (0,65 l/ha; 21 dni), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; 14 dni), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha; 21 dni za vinsko grozdje), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha; 14 dni), **TOPAS 100 EC** (0,3 l/ha; 28 dni) ali **TOPAZE** (0,3 l/ha; 28 dni), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha; 14 dni za vinsko grozdje), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha; 14 dni), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha; 28 dni), **TALENDO** (0,25 l/ha; 28 dni), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha; 42 dni), ...

Proti **peronospori vinske trte** v primeru bujne rasti za zadnjo zaščito dodate **PRIPRAVEK NA OSNOVI BAKRA**: CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; 21 dni), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc. ; 21 dni), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha; 21 dni), KOCIDE 2000 (0,20 % konc. ; 35 dni), CUPROXAT (0,75 % konc. ; 28 dni) ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75 % konc. ; 28 dni). V primeru varstva aromatičnih sort pa je smiselna izbira katerega od sintetičnih preventivnih fungicidov kot so: DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; 28 dni), DITHANE M-45 (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; 28 dni), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; 28 dni), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; 28 dni), FOLPAN 50 SC (3 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha; 35 dni za vinsko grozdje).

Za zmanjševanje pojava okužb s **sivo plesnijo** je na občutljivejših belih sortah preudarno pristopati z redno rabo bioloških pripravkov z antagonističnim delovanjem kot je npr. **BOTECTOR** (na osnovi *Aureobasidium pullulans*; 400 g/ha; karencja je zagotovljena s časom uporabe) Pripravek **SERENADE ASO** (na osnovi *Bacillus subtilis*; 8 l/ha; ni karence) ima dovoljenje za uporabo le v pridelavi namiznega grozdja. Oba pripravka sta primerna za ekološko pridelavo.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.**

Datum objave obvestila: 12.08.2016 13:14

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)