

Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Krompir
/ 18. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU

18. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU - 20.03.2017 14:35 - Zaključeno



Fenološki razvoj krompirja

Sajenje krompirja poteka v polnem teku, zgoden pa je že posajen. Razvojna faza: 00 – 09 po BBCH.

Zatiranje plevelov

Za **zatiranje plevelov** v krompirju pred vznikom lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **ACTIVUS 40 WG** (5 kg/ha), **BOXER** (5 L/ha), **BUZZIN** (0,75 kg/ha), **METRIC** (1 – 1,5 L/ha), **PLATEEN WG 41,5** (2 – 2,5 kg/ha), **PROMAN** (3 L/ha), **SENCOR SC 600** (0,15 – 0,75 L/ha), **SHARPEN 33 EC** (3 – 5 L/ha), **SHARPEN 40 SC** (2,5 – 4 L/ha), **STALLON SYNC TEC** (3 L/ha) ali **STOMP AQUA** (2,9 L/ha).

Po vzniku pridejo v poštev naslednja registrirana sredstva: **AGIL 100 EC** (0,75 – 1,5 L/ha), **ARAMO 50** (1 – 2 L/ha), **BASAGRAN** (1,5 – 2 L/ha), **BASAGRAN 480** (1,5 – 2 L/ha), **FICUS ULTRA** (1 – 4 L/ha), **FUSILADE FORTE** (0,8 – 1,5 L/ha), **RACER 25 – EC** (1 – 4 L/ha) ali **TAROT 25 WG** (40 – 50 g/ha).

Več si lahko o lastnostih navedenih herbicidov preberete na naslednji povezavi: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin> (herbicidi v krompirju).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 20.03.2017 14:35

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

