

Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Oljna ogrščica  
/ 20. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KLJUNOTAJEV V OLJNI OGRŠČICI

## 20. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KLJUNOTAJEV V OLJNI OGRŠČICI - 20.03.2017 14:37 - Zaključeno



Oljna ogrščica se trenutno nahaja v razvojni stopnji podaljševanja stebela (30 – 39 po BBCH). Pri kontroli posevkov smo že opazili prve pojave **repičnega kljunotaja (*Ceutorhynchus napi*)**, ki pa ne presegajo praga škodljivosti 2 - 4 hroščke na 10 rastlin oz. 5 hroščev na dan na rumeno posodo. Odrasli osebki so prezimili v tleh. Izletavati so začeli, ko se je temperatura tal dvignila na 6 °C (trenutna temperatura na lokaciji Novo mesto je na 5 cm 7,8 °C).

Pridelovalcem priporočamo, da naj bodo pozorni in pregledajo posevke. Če opazite presežen prag škodljivosti priporočamo uporabo enega izmed naslednjih pripravkov: **KAISO EG (150 g/ha)**, **KARATE ZEON 5 CS (0,15L/ha)**, **SPARVIERO (0,075 l/ha)** ali **DECIS 2,5 EC (0,3 L/ha)**, **DECIS 2,5 EC (0,3 L/ha)**, **DECIS 100 EC (63 ml/ha)**, **GAT DECLINE 2,5 EC (0,3 L/ha)**, **POLECI (0,3 L/ha)** oz. **MAVRIK 240 EW (0,2 L/ha)** in **FASTAC 100 EC (0,1 L/ha)**

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih oprasovalcev.**

Datum objave obvestila: 20.03.2017 14:37

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)