



26. VARSTVO JAGOD - 21.03.2017 14:29 - Zaključeno



Z začetkom pomladi je potrebno v nasadih jagod za zmanjšanje potenciala bolezni in škodljivcev odstraniti odmrle liste in odvečne izrastke. Rastlinske ostanke odstranite in uničite izven nasada.

Sledi uporaba **pripravkov na osnovi bakra: NORDOX 75 WG** (za zaščito pred **bakterijskim ožigom** (*Xanthomonas fragariae*), **jagodno rdečo listno pegavostjo** (*Diplocarpon earlianum*) in **gnomonijsko gnilobo jagod** (*Gnomonia fructicola*); v odmerku 3,3 kg/ha; ob porabi vode 400-800 l/ha, največ enkrat letno;) ali **CUPRABLAU Z 35 WP** (za zatiranje **bele jagodne listne pegavosti** (*Mycosphaerella fragariae*) in **jagodne rdeče listne pegavosti** (*Diplocarpon earliana*); v odmerku 1,5 kg/ha ob porabi vode 300 do 1000 l/ha).

Za zmanjšanje okužb z **jagodno pepelasto plesnijo** svetujemo dodajanje pripravkov na osnovi žvepla kot je npr. **THIOMT JET** (2-4 kg/ha). Slednji ima tudi stransko delovanje na razvoj **škodljivih vrst pršic**.

Hkrati bodite pri pregledih nasadov pozorni na pojavljanje **ciklamine (jagodove) pršice** in **jagodovega cvetožera**.

Vsekakor poskrbite za zaščito s fitofarmaceutskimi sredstvi še pred dežjem!

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 21.03.2017 14:29

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)