

93. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 04.11.2020 14:31 - Zaključeno



V nasadih breskev in nektarin priporočamo jesensko varstvo pred **breskovo kodravostjo**. Primeren termin za nanos pripravkov na osnovi bakra je v času odpadanja listja. S tem tretiranjem boste hkrati poskrbeli še za zaščito lesa pred **drugimi glivičnimi** in **bakterijskim obolenji**. Izbirate lahko med: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha) ali **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha).

Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičarjev (breskev, marelica, češnja, sliva), kot so **listne luknjičavosti**, **monilinijska obolenja**, **listne pegavosti** in **ožigi**, lahko opravite tudi s **CUPRABLAU Z 35 WG** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2-3 kg/ha; le za marelico, češnjo, višnjo in slivo) ali **BADGE WG** (3,5 kg/ha).

Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Za nanos je priporočljivo uporabiti večjo količino vode.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri nizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.

Datum objave obvestila: 04.11.2020 14:31

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

